

AIDE-MÉMOIRE EXAMEN PHYSIQUE DU CORPS

L'application de la règle de soins garantit que l'infirmière s'est bien assurée que l'usager est sans signe de vie et qu'une ordonnance de non-réanimation est inscrite au dossier.

L'examen physique du corps se fait de la tête aux pieds (face antérieure et postérieure).

Éléments d'évaluation	Description
Signes vitaux et neurologiques	<ul style="list-style-type: none"> • Réponse à la stimulation (verbale et toucher), pouls → bruit cardiaque à l'apex (auscultation sur une minute, voir site anatomique au verso) • Respiration (s'approcher pour entendre et sentir si de l'air sort du nez ou de la bouche, regarder si la poitrine se soulève ou s'abaisse) • Réactivité des pupilles
Rigidité	<ul style="list-style-type: none"> • Absence ou présence de rigidité (difficulté ou impossibilité de mobiliser) à la mâchoire, membres supérieurs et membres inférieurs • Contracture des muscles • S'installe après 2 à 4 heures pour devenir maximale vers 6 à 12 heures • Disparaît de 36 à 48 heures • S'installe plus rapidement dans les petits muscles : la rigidité de la mâchoire s'installe avant celle des membres supérieurs et celle des membres supérieurs avant celle des membres inférieurs
Signes de traumatismes	<ul style="list-style-type: none"> • Lacération, abrasion, plaie, plaie pénétrante, déformation, œdème localisé
Lividités	<ul style="list-style-type: none"> • Absence ou présence et indiquer les sites • Accumulation des globules rouges aux régions déclives • Apparaissent comme une décoloration de la peau de couleur bourgogne • S'installent en 30 minutes jusqu'à 120 minutes • Mobiles de 8 à 12 heures et fixes par la suite • Absences aux points de pression • Indiquent la position dans laquelle se trouvait l'usager au moment du décès



Site anatomique du pouls apical

Auscultation avec stéthoscope sur 1 minute

